

Редакція:

13.03.2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2017

м. Київ

N 268

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2017 р. за N 392/30260

Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до [статті 16⁵ Закону України "Про пестициди і агрохімікати"](#) та підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого [постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267](#),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, затверджених [наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року N 55](#), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за N 207/28337 (у редакції [наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 2016 року N 282](#)), виклавши їх у новій редакції, що додаються.
2. Управлінню громадського здоров'я (Півень Н. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Сивак О. В.

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Президент НАМН
академік

В. І. Цимбалюк

Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства
України з питань
європейської інтеграції

О. Трофімцева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я
України

02 лютого 2016 року N 55

(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 13 березня 2017 року N 268)

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

23 березня 2017 р. за N 392/30260

Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

N з/п	Назва препарату	Назва діючої речовини	Допус- тима добова доза, мг/кг	Максимально допустимий рівень в продуктах харчування, мг/кг (мг/л)		Гранично- допустима концентрація /орієнтовно безпечний рівень впливу в повітрі робочої зони, мг/м ³	Гранич- допусти концентр /орієнто безпеч- рівень в п в атмосфер повітр мг/м ³
				культура	максимально допустимий рівень		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	AG-PII-62,5, ME	пропахізафоп, 25 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,2** (межа визначення методом газорідинної хроматографії (далі - межа визн. ГРХ)-0,2)	/1,0	/0,000
		імазетапір, 37,5 г/л	1,0		0,1* (межа ви- значення методом високоєфектив- ної рідинної хроматографії (далі - межа визн. ВЕРХ)-0,1)	/0,5	/0,04
		пропахізафоп, 25 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	/1,0	/0,000
		імазетапір, 37,5 г/л	1,0		не потр.*	/0,5	/0,04
		пропахізафоп, 25 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,000
		імазетапір, 37,5 г/л	1,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,3)	/0,5	/0,04
		пропахізафоп, 25 г/л +	0,003	соя (олія)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	/1,0	/0,000
		імазетапір, 37,5 г/л	1,0		не потр.*	/0,5	/0,04
		мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,000
				кукурудза (олія)	не потр.*		
3	ARY-0938- 001, КС (MTF-753, КС)	пентіопірад, 200 г/л	0,1	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,5	/0,01

				ріпак (насіння)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				ріпак (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)		
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)		
				соя (зерно)	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				соя (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)		
				томати	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				томатний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				виноград	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				виноградний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				яблука	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				Контроль по пропіконазолу та піра			

4	Абакус Плюс, КЕ	флуксапіроксад, 30 г/л +	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,01
		пропіконазол, 125 г/л +	0,04		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,00
		піраклостробін, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
5	Аболір, РГ	гліфосату амонійна сіль, 757 г/кг (в кислотному еквіваленті - 687 г/кг)	0,01	обробка землі під пар, землі несіль- ськогос- подарського призначення, осіння та весняна обробка сільськогос- подарських угідь	не потр.	1,0/	/0,01
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)		
				ріпак (насіння)	2,0* (межа визн. ВЕРХ-0,4)		
				ріпак (олія)	не потр.*		
6	Авенор WG, ВГ	сульфосульфурон, 750 г/кг	0,01	зерно хлібних злаків	0,005* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/1,5	/0,00
7	Авіценна, СЕ	Контроль по прохлораз					
		тебуконазол, 50 г/л +	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
		прохлораз, 250 г/л +	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,00
		крезоксим-	0,1		0,05**	/1,0	/0,05

		метил, 50 г/л			(межа визн. ВЕРХ-0,05)		
8	Агріфос, БТ	фосфід алюмінію, 560 г/кг		Контроль по фосфіну			
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визначення індикаторними трубками Дрегера (далі - межа визн. інд. труб. Дрегера) - 0,007)	0,1/	0,01 - максимал разові 0,001 середні добові
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. інд. труб. Дрегера - 0,007)		
				соняшник (насіння)			
				арахіс, какао (боби), горіхи, цукор, спеції, сухі овочі, сухі фрукти, тютюн, чай	0,1* (межа визн. інд. труб. Дрегера - 0,007) 0,01* (межа визн. інд. труб. Дрегера - 0,007)		
				складські приміщення, трюми, вагони, контейнери			
9	Агрозахист, КС	імідаклоприд, 500 г/л	0,06	картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
10	Агрокіппер, КЕ	хізалофоп- П-етил, 90 г/л	0,01	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2	/0,04
				Контроль по прохлоразу та тебу			

11	Агроуніверсал, ТН	прохлораз, 60 г/л + тебуконазол, 15 г/л	0,001 0,03	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04) 0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,1 /0,4	/0,00 /0,02
12	Айдахо, КС	тербутилазин, 500 г/л	0,003	соняшник (насіння) соняшник (олія) кукурудза (зерно) кукурудза (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2) не потр.* 0,4* (межа визн. ГРХ-0,2) не потр.*	/1,0	/0,05
13	Аконіт БТ, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків яблука яблучний сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05) 0,05* (межа визн. ГРХ-0,05) 0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00
14	Акріс, СЕ (BAS 657 01 Н)	диметенамід-П, 280 г/л +	0,02	Контроль по диметенамід-П, тер			
		тербутилазин, 250 г/л	0,003	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01
		диметенамід-П, 280 г/л +	0,02	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01
		диметенамід-П, 280 г/л	0,02	кукурудза	не потр.*	/1,0	/0,05
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01

		+		(зерно)	(межа визн. ВЕРХ-0,02)		
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05
		диметенамід-П, 280 г/л	0,02	кукурудза (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01
		+					
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05
15	Аксакал, ВГ	флорасулам, 250 г/кг	0,05	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				кукурудза (олія)	не потр.		
16	Аксіал 050 ЕС, КЕ	піноксаден, 50 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
17	Актарофіт, КЕ	аверсектин С, 0,2 %	0,08	огірки закритого ґрунту	0,005* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,4	не нормуєт
18	Альто 240 ЕС, КЕ	ципроконазол, 240 г/л	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01
				буряки цукрові	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)		
19	Амістар Голд 250 SC, КС	азоксистробін, 250 г/л	0,03	Контроль по азоксистробіну, дифенокона			
		+		соняшник ¹ (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,003
			0,03		не потр.*	/1,0	/0,01

		азоксистробін, 250 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,4)	/0,2	/0,00 ⁺
		дифеноконазол, 125 г/л					
20	Амістар Екстра Голд 280 ОД, МД	азоксистробін, 200 г/л +	0,03	Контроль по азоксистробіну, ципрокона:			
				зерно хлібних злаків ¹	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01
21	Ампліго 150 ЗС, ФК	хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	Контроль по хлорантраніліпролу, лямб			
				соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00 ⁺
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.*	/1,5	/0,015
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00 ⁺
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	Томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00 ⁺
		хлорантранілі-	0,02		не потр.*	/1,5	/0,015

		прол, 100 г/л + лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00 ⁺
22	Ампліго 150 ЗС, ФК	хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	Контроль по хлорантраніліпролу, лямб			
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	яблучний сік	не потр.*	/1,5	/0,015
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00 ⁺
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00 ⁺
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02		0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00 ⁺
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,015
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02		0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1	/0,00 ⁺

		цигалотрин, 50 г/л			(межа визн. ГРХ-0,02)	небезпечний при потраплянні на шкіру	
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02		не потр.*	/1,5	/0,015
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	соя (олія)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005
23	Антикліщ Макс, КЕ	піриміфос-метил, 200 г/л +	0,01	Контроль по піриміфос-метилу, піридабену			
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	2/0	/0,005
		піридабен, 150 г/л +	0,03		0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		ацетаміприд, 50 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		піриміфос-метил, 200 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	2/0	/0,005
			0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,005
		піридабен, 150 г/л +	0,01		не потр.	/0,2	/0,005
		ацетаміприд, 50 г/л	0,01	яблука	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	2/0	/0,005
		піриміфос-метил, 200 г/л +	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,005
		піридабен, 150 г/л +	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,005
		ацетаміприд,					

		50 г/л	0,01	яблучний сік	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	2/0	/0,00
		піриміфос-метил, 200 г/л +	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,00
		піридабен, 150 г/л +	0,01		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,00
		ацетаміприд, 50 г/л	0,01	декоративні культури відкритого ґрунту ²	не потр.	2/0	/0,00
		піриміфос-метил, 200 г/л +	0,03		не потр.	/0,2	/0,00
		піридабен, 150 г/л +	0,01		не потр.	/0,2	/0,00
		ацетаміприд, 50 г/л					
24	Антилопа, КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,07	/0,00
				соняшник (олія)	не потр.*		
25	Апріорі, ВГ	нікосульфурон, 230 г/кг +	2,0	Контроль по мезотріоні			
		мезотріон, 570 г/кг	0,001	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01
		нікосульфурон, 230 г/кг +	2,0		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,00
		мезотріон, 570 г/кг	0,001	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01
					не потр.*	/0,2	/0,00

26	Апрон XL 350 FS, TH	металаксил-М, 350 г/л	0,03	капуста цвітня	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	0,5/	/0,01
27	Армор, КС	імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	Контроль по імідаклоприду та лямбда:			
				зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		не потр.*	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005
28	Артист, ВГ	флуфенацет, 240 г/кг +	0,004	-	-	/0,7	/0,005
		метрибузин, 175 г/кг	0,004	-	-		/0,005
29	Архітект, СЕ	мепікват-хлорид, 150 г/л +	0,2	Контроль по мепікват-хлориду та пік:			
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	1,0 (межа визначення фотометричним методом (далі - межа визн. ФМ)-0,5) 0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,35 /1,0	/0,01 /0,01

		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
		мепікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	соняшник (олія)	не потр.	/0,35	/0,01
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02		не потр.	/1,0	/0,01
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		не потр.	/1,0	/0,01
		мепікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	ріпак (насіння)	1,0* (межа визн. ФМ-0,5)	/0,35	/0,01
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02		0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
		мепікват- хлорид, 150 г/л +	0,2	соняшник (олія)	не потр.	/0,35	/0,01
		прогексадіон кальцію, 25 г/л +	0,02		не потр.	/1,0	/0,01
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
30	АС Селектив (Тіамат), ТН	тіаметоксам, 100 г/л +	0,02	Контроль по тіаметоксаму та аце			
				картопля ²	0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,5 аерозоль	/0,03

		ацетаміприд, 100 г/л +	0,01		0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2	/0,003
		флудіоксоніл, 20 г/л	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,003
31	Астра, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01
				кукурудза (олія)	не потр.		
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)		
				соняшник (олія)	не потр.		
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)		
				соя (олія)	не потр.		
32	АТО ЖУК, КС	тіаметоксам, 100 г/л +	0,02	Контроль по тіаметоксаму, лямбда-цигалотрин			
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л +	0,003	картопля ²	0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,5 аерозоль	/0,03
		альфа- циперметрин, 15 г/л	0,005		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
					0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
33	Ацетал, КЕ	ацетохлор, 900 г/л	0,001	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	1,0/	/0,003
					0,01*		

				сосяшник (олія)	(межа визн. ГРХ-0,01)		
34	База, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	сося (зерно)	0,1* (межа визначення методом тонкошарової хроматографії (далі - межа визн. ТШХ)-0,1)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
				сося (олія)	не потр.		
35	Байндстрайк ЕС, КЕ	флуроксипір, 333 г/л	0,2	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,003
				кукурудза (олія)	не потр.*		
36	Баклер, МЕ	тебуконазол, 200 г/л +	0,03	Контроль по тебуконазолу та ме			
				ріпак (насіння)	0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
		метконазол, 50 г/л	0,001		0,2** (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,003
		тебуконазол, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/0,4	/0,02
		метконазол, 50 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,003
37	Баклер, МЕ	тебуконазол, 200 г/л +	0,03	Контроль по тебуконазолу та ме			
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
		метконазол, 50 г/л	0,001		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,003
38	Бамбу 480, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	сося (зерно)	0,02* (межа визн.	/0,5	/0,01

					ГРХ-0,02)		
				соя (олія)	не потр.*		
39	Банджо Форте, КС	диметоморф, 200 г/л +	0,1	Контроль по диметоморфу			
		флуазинам, 200 г/л	0,01	томати	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,00%
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00%
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,00%
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00%
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00%
		диметоморф, 200 г/л +	0,1	картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,00%
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,00%
		диметоморф, 200 г/л +	0,1		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00%
		флуазинам, 200 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00%
					0,01 (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,00%
					0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00%

40	Баркас, СЕ	2,4-Д 2-етил- гексильовий ефір, 452, 42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л	0,0001 0,05	Контроль по 2,4-Д		Контроль по 2,4-Д 2-етилгексильовому еф	
				зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02) 0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,5 /1,0	/0,000 /0,000
41	Барклей Корріб, КЕ	прохлораз, 300 г/л + епоксиконазол, 75 г/л	0,001 0,004	Контроль по прохлораз			
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04) 0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 /0,01	/0,000 /0,000
42	Барклей Харлей ЕС, КЕ	флуороксіпір метилгептиловий ефір, 290 г/л	0,2	Контроль по флуороксіпіру			
				мак	0,025* (межа визн. ГРХ-0,025)	/1,0	/0,000
43	Белт 480 SC, КС	флубендіамід, 480 г/л	0,003	соє (зерно)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05) не потр.	/0,2	/0,000
				соє (олія)			
44	Белт Експерт 480 SC, КС	флубендіамід, 480 г/л +	0,003	Контроль по флубендіаміду та тіа			
		тіаклоприд, 240 г/л	0,006	виноград	0,8 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,2	/0,000
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	виноградний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,3	/0,000
		тіаклоприд, 240 г/л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,000

		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	яблука	0,8** (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,2	/0,00%
		тіаклоприд, 240 г/л	0,006		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,06)	/0,3	/0,00%
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	яблучний сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,00%
		тіаклоприд, 240 г/л	0,006		0,06* (межа визн. ВЕРХ-0,06)	/0,3	/0,00%
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	груші	0,8** (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,2	/0,00%
		тіаклоприд, 240 г/л	0,006		0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,3	/0,00%
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	грушевий сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,00%
		тіаклоприд, 240 г/л	0,006		0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,3	/0,00%
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	персики	0,8** (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,2	/0,00%
		тіаклоприд, 240 г/л	0,006		0,5** (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,3	/0,00%
		флубендіамід, 480 г/л +	0,003	персиковий сік	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,00%
		тіаклоприд, 240 г/л	0,006		0,2 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,3	/0,00%
45	Бельведер	десмедифам,	0,001	Контроль по етофумеза:			
				буряки	0,02*	1,0/	/0,01

	Форте, СЕ	100 г/л + фенмедифам, 100 г/л + етофумезат, 200 г/л	0,03 0,1	цукрові	(межа визн. ТШХ-0,02) 0,2* (межа визн. ГРХ-0,01) 0,2* (межа визн. ТШХ-0,2)	/0,5 /0,1	/0,00 /0,01
46	Беркут, КЕ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
47	Бластер, ЗП	гекситіазокс, 200 г/кг	0,04	соє (зерно) соє (олія)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05) не потр.	/0,5	/0,05
48	Блу Бордо, ВГ	міді сульфат, 770 г/кг	0,05 (по міді)	картопля томати томатний сік	10* (межа визн. ТШХ-1,0) 5* (межа визн. ТШХ-1,0) 5* (межа визн. ТШХ-1,0)	0,5/	0,003 максимал разові 0,001 середні добові
49	Блюз, КС	дифеноконазол, 200 г/л + крезоксим- метил, 100 г/л дифеноконазол,	0,002 0,1 0,002	Контроль по дифеноконазолу та кре:			
				яблука ²	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05) 0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2 /1,0	/0,00 /0,05

		200 г/л +		яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00
		крезоксим- метил, 100 г/л	0,1		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,05
		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	абрикоси ²	0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,2	/0,00
		крезоксим- метил, 100 г/л	0,1		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,05
		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	абрикосовий сік	0,08* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00
		крезоксим- метил, 100 г/л	0,1		не потр.	/1,0	/0,05
		дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	троянди ²	не потр.	/0,2	/0,00
		крезоксим- метил, 100 г/л	0,1		не потр.	/1,0	/0,05
50	Болівар Форте, КС	тебуконазол, 240 г/л +	0,03	Контроль по тебуконазолу та крезс			
		крезоксим- метил, 100 г/л	0,1	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4 /1,0	/0,02 /0,05
					0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)		
51	Борей Нео, КС	альфа- циперметрин, 15 г/л +	0,005	Контроль по альфа-циперметрину та			
		імідаклоприд,	0,06	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00
					0,1**	/0,2	/0,00

		500 г/л +			(межа визн. ВЕРХ-0,05)		
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02
		альфа- циперметрин, 15 г/л +	0,005	буряки цукрові	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		імідаклоприд, 500 г/л +	0,06		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02
		альфа- циперметрин, 15 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		імідаклоприд, 500 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02
		альфа- циперметрин, 15 г/л +	0,005	соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		імідаклоприд, 500 г/л +	0,06		не потр.*	/0,2	/0,003
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.*	/1,5	/0,02

52	Борей Нео, КС			Контроль по альфа-циперметрину та			
				картопля	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		альфа- циперметрин, 15 г/л +	0,005				
		імідаклоприд, 500 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02
		альфа- циперметрин, 15 г/л +	0,005	томати	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		імідаклоприд, 500 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02
		альфа- циперметрин, 15 г/л +	0,005	томатний сік	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		імідаклоприд, 500 г/л +	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02
		альфа- циперметрин, 15 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,05*	/0,2	/0,003

		+			(межа визн. ВЕРХ-0,05)		
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02
		альфа- циперметрин, 15 г/л	0,005	кукурудза (олія)	не потр.	/0,1	/0,003
		+				небезпечний при потраплянні на шкіру	
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		не потр.	/0,2	/0,003
		+					
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.	/1,5	/0,02
		альфа- циперметрин, 15 г/л	0,005	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,003
		+				небезпечний при потраплянні на шкіру	
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,003
		+					
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02
		альфа- циперметрин, 15 г/л	0,005	соя (олія)	не потр.	/0,1	/0,003
		+				небезпечний при потраплянні на шкіру	
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,003
		+					
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		не потр.	/1,5	/0,02
53	Брітекс 40 РК	імазамокс,	3,0	соняшник	1,0*	/1,0	/0,04

		40 г/л		(насіння)	(межа визн. ВЕРХ-0,5)		
				соняшник (олія)	не потр.		
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)		
				соя (олія)	не потр.		
54	Брокер, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	землі під посадку овочевих та посів сільськогос- подарських культур, обробка землі під пар, землі несіль- ськогос- подарського призначення, обробка грунту після збирання врожаю ¹	не потр.	1,0/	/0,01
				зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)		
				кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				кукурудза (олія)	не потр.		
				картопля	0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)		
				Контроль по 2,4-Д		Контроль по 2,4-Д 2-етилгексиловому еф	

55	Буксир, КЕ (Тауерспрей 905 ЕС)	2,4-Д 2-етил- гексилловий ефір, 905 г/л	0,0001	зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,000
56	Бюктрил 327,5 ЕС, КЕ	бромоксиніл октаноат, 327,5 г/л	0,001	Контроль по бромоксині			
				цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,3	/0,00
Контроль по тіаметокса.							
57	Вайбранс Інтеграл 235 FS, ТН	седаксан, 25 г/л +	0,1	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/0,03 (межа ви ВЕРХ-0,0
		тіаметоксам, 175 г/л +	0,02		0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,00
		тебуконазол, 10 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
58	Вайбранс 500 FS, ТН	седаксан, 500 г/л	0,1	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,03
59	Вайбранс Тріо 60 FS, ТН	седаксан, 25 г/л +	0,1	Контроль по флудіоксонілу та теб			
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,03
					0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,00
		тебуконазол, 10 г/л	0,03	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02	
60	Вальтер, ЗП	манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	Контроль по манкоцебу, метала			
				картопля ²	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01

		металаксил, 80 г/кг	0,03		0,05* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5/	/0,01
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	томати ²	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01
		металаксил, 80 г/кг	0,03		0,2** (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01
		манкоцеб, 640 г/кг +	0,005	томатний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01
		металаксил, 80 г/кг	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	0,5/	/0,01
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003	картопля	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	не потр.	не пот
				томати	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)		
				томатний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)		
61	Вейрон, КС	флуметсулам, 120 г/л +	0,2	Контроль по флуметсуламу та фл			
		флорасулам, 80 г/л	0,05	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,02
					0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003
62	Верімарк 20 SC, КС	циантраніліпрол, 200 г/л	0,002	капуста	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,003
				томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)		
					0,1*		

				томатний сік	(межа визн. ВЕРХ-0,05)		
63	Вертимек 018 ЕС, КЕ	абамектин, 18 г/л	0,0002	огірки ²	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,000
				яблука ²	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)		
				суніця ²	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)		
				перець ²	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)		
				баклажани ²	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)		
64	Вінес 40, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
				соняшник (олія)	не потр.		
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)		
				соя (олія)	не потр.		
65	Вождь, КС	тербутилазин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	Контроль по тербутилазину та S-м			
		тербутилазин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05
		тербутилазин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	кукурудза (олія)	не потр.* не потр.*	/0,5	/0,02

66	Вулкан Плюс, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	осіння та весняна обробка сільськогос- подарських угідь, міжрядь в садах та виноградни- ках ²	не потр.*	1,0/	/0,01
67	Гавань, МД	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно) кукурудза (олія)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.*	/1,0	/0,01
68	Гарант, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	землі під посадку овочевих та посів сільськогос- подарських культур навесні та восени після збирання врожаю	не потр.*	1,0/	/0,01
69	Гаучо Плюс 466 FS, ТН	клотіанідин, 233 г/л +	0,08	Контроль по клотіанідину та імідаклоприду			
				зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		клотіанідин, 233 г/л +	0,08	сорго	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2	/0,005
		клотіанідин, 233 г/л +	0,08	соя (зерно)	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02
		імідаклоприд,	0,06		0,05* (межа визн.	/0,2	/0,005

		500 г/л			ВЕРХ-0,02)		
		клотіанідин, 233 г/л +	0,08	соє (олія)	не потр.*	/1,5	/0,02
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		не потр.*	/0,2	/0,005
70	Герой, РК	імазамокс, 33 г/л +	3,0	Контроль по імазамоксу та ім:			
				соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
71	Грано БТ, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,005
72	Грантор, ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,005
73	Грінфорт АС, КС	азоксистробін, 250 г/л +	0,03	Контроль по азоксистробіну та ф:			
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
		флутріяфол, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005

74	Грінфорт БЗ 480, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
				соє (олія)	не потр.*		
75	Грінфорт Конфі, ТН	імідаклоприд, 500 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,00%
76	Грінфорт НК 40, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	1,0	/0,01
				кукурудза (олія)	не потр.*		
77	Грінфорт Проніт, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	1,0	/0,01
				кукурудза (олія)	не потр.*		
78	Гроділ Максі 375 OD, МД	амідосульфурон, 100 г/л +	0,2	Контроль по амідосульфурону та йодосульфурон-метил натрію		Контроль по амідосульфурону	
				льон (насіння)	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	1,0/	/0,00%
		йодосульфурон- метил натрію, 25 г/л +	0,03		0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	1,0	/0,00%
		антидот мефенпір-діетил, 250 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не пот
		амідосульфурон, 100 г/л +	0,2	льон (олія)	не потр.*	1,0/	/0,00%
		йодосульфурон- метил натрію,	0,03		не потр.*	1,0	/0,00%

		25 г/л + антидот мефенпір-діетил, 250 г/л	не потр.		не потр.*	не потр.	не пот
79	Грум БГ, РК	хлормекват хлорид, 750 г/л	0,001	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ТШХ-0,2)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,02
				ріпак (олія)	не потр.*		
80	Девайс Ультра, РК	імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	3,0	Контроль по імазамоксу та іма			
				соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
			1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
		імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л	3,0	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,04
			1,0		не потр.	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
81	Десикант Макс, РК	дикват дибромід, 300 г/л	0,002	соняшник ¹ (насіння)	0,5* (межа визн. ФМ-0,05)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,002
				соняшник (олія)	0,1 (межа визн. ФМ-0,05)		
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)		
				соя	0,1		

				(олія)	(межа визн. ФМ-0,05)		
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)		
				ріпак (олія)	не потр.*		
82	Десикаш, РК	дикват дибромід, 150 г/л	0,002	картопля	0,2* (межа визн. ФМ-0,2)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
83	Дефолт, РК	клопіралід, 300 г/л	0,15	зерно хлібних злаків ²	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	2,0/	/0,01
84	Дехканін, РК	гліфосату калієва сіль, 663 г/л	0,01	осіння та весняна обробка землі несільсь- когос- подарського призначення, землі під пар	не потр.	1,0/	/0,01
85	Джип, КС	флуазинам, 500 г/л	0,01	томати	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
				томатний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
86	Дікогерб Супер, РК	2М-4Х диметиламінна сіль, 660 г/л (у кислотному еквіваленті) + дикамби диметиламінна сіль, 90 г/л	0,008	Контроль по 2М-4Х та дикс			
				кукурудза (зерно)	0,1 (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,02
			0,004		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01

		(у кислотному еквіваленті) 2М-4Х диметиламінна сіть, 660 г/л (у кислотному еквіваленті) + дикамби диметиламінна сіть, 90 г/л (у кислотному еквіваленті)	0,008	кукурудза (олія)	не потр.	1,0/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,02
			0,004		не потр.*	1,0/	/0,01
87	Дімбо Форте, ВГ	дикамба, 600 г/кг +	0,004	Контроль по дикамбі та нікосу			
				кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01
		нікосульфурон, 120 г/кг	2,0		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01
		дикамба, 600 г/кг +	0,004	кукурудза (олія)	не потр.*	1,0/	/0,01
		нікосульфурон, 120 г/кг	2,0		не потр.*	/1,0	/0,01
88	Дикамба 480 SL, РК (торгова назва Мінерв/ Оцеал 480 SL, РК)	дикамба, 480 г/л	0,004	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	1,0/	/0,01
				кукурудза (олія)	не потр.*		
89	Док Про, ЗП	цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	Контроль по цимоксанілу та мікл			
				картопля ²	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,03
		міклобутаніл, 200 г/кг	0,03		0,06** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,7	/0,003
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соя (зерно)	0,5* (межа визн.	/1,0	/0,03

		міклобутаніл, 200 г/кг	0,03		ГРХ-0,2) 0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,7	/0,003
		цимоксаніл, 300 г/кг +	0,05	соє (олія)	не потр.	/1,0	/0,03
		міклобутаніл, 200 г/кг	0,03		не потр.	/0,7	/0,003
90	Дорпан 480, КЕ	хлорпірифос, 480 г/л	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,3 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
91	Дятел, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	Контроль по хлорпірифос			
		циперметрин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,3 небезпечний при потраплянні на шкіру /0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003 0,04 - максимал разові 0,01 - середні добові
92	Егіда, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,003
				кукурудза (олія)	не потр.*		
93	Експрес® Голд, ВГ	трибенурон- метил, 562 г/кг +	0,005	Контроль по трибенурон-м			
		тіфенсульфурон- метил,	0,01	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02) 0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,1 /0,1	/0,003 /0,01

		187,5 г/кг трибенурон-метил, 562 г/кг +	0,005	соняшник (олія)	не потр.*	/0,1	/0,005
		тіфенсульфурон-метил, 187,5 г/кг	0,01		не потр.*	/0,1	/0,01
94	Елатус PIA 358 EC, KE	пропіконазол, 208,33 г/л +	0,04	Контроль по пропіконазолу та с			
		солатенол, 83,3 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків ¹	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,005
		ципроконазол, 66,67 г/л	0,002		0,04** (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,005 (межа ви ВЕРХ-0,0
					0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01
95	Еlegant 2 FD, CE	2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452, 42 г/л +	0,0001	Контроль по 2,4-Д		Контроль по 2,4-Д 2-етилгексиловому еф	
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,000
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452, 42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,005
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		не потр.	/0,5	/0,000
		2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452, 42 г/л +	0,0001	сорго	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,000

		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,003
96	Еліт Хантер Дуо, КС	клотіанідин, 150 г/л +	0,08	Контроль по клотіанідину та лямбда			
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	ріпак (насіння) ріпак (олія)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02
		клотіанідин, 150 г/л +	0,08		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		не потр.	/1,5	/0,02
97	Ембрелія 140 SC, КС	ізопіразам, 100 г/л +	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		дифеноконазол, 40 г/л	0,002	Контроль по ізопіразаму, дифені			
		ізопіразам, 100 г/л +	0,01	вишні	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,5	/0,003
		дифеноконазол, 40 г/л	0,002		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04) 0,1**	/0,2	/0,003
98	Еместо Квантум 373,5 FS, TH	клотіанідин, 207 г/л +	0,08	вишневий сік	(межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,5	/0,003
					0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,003
98	Еместо Квантум 373,5 FS, TH	клотіанідин, 207 г/л +	0,08	Контроль по клотіанідину та пер			
				картопля	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02
					0,01**	/1,0	/0,01

		пенфлуфен, 66,5 г/л	0,02		(межа визн. ВЕРХ-0,01)		
99	ЕнВіАгро, КС	спіродиклофен, 240 г/л	0,001	яблука	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2	/0,000
				яблучний сік	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)		
100	Енжіо 247 SC, КС	тіаметоксам, 141 г/л + лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,02 0,003	Контроль по тіаметоксаму, лямбда-			
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5 аерозоль	/0,03
					0,01* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00
101	Епік, ВГ	цимоксаніл, 250 г/кг + фамоксадон, 250 г/кг цимоксаніл, 250 г/кг + фамоксадон, 250 г/кг	0,05 0,01 0,05 0,01	Контроль по фамоксадону			
				соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,03
					0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,01
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,03
					0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
102	Ефімер, КЕ	2,4-Д 2-етил- гексильовий ефір, 905 г/л	0,0001	Контроль по 2,4-Д		Контроль по 2,4-Д 2-етилгексильовому еф	
				зерно хлібних злаків	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,000
				кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)		

				кукурудза (олія)	не потр.		
103	Євро БТ, РК	імазамокс, 33 г/л +	3,0	Контроль по імазамоксу та іма			
				соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
				соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,04
		імазамокс, 33 г/л +	3,0				
		імазапір, 15 г/л	1,0				
104	Євро-3315, РК	імазамокс, 33 г/л +	3,0	Контроль по імазамоксу та іма			
				соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
				соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,04
		імазамокс, 33 г/л +	3,0				
		імазапір, 15 г/л	1,0				
105	Життєдар, КС	тіабендазол, 50 г/л +	0,1	Контроль по тіабендазолу та фл			
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,08

		флутріафол, 50 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00
106	Жокей, КС	ципроконазол, 80 г/л + азоксистробін, 200 г/л	0,002 0,03	Контроль по ципроконазолу та азс			
				зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01
					0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
107	Забрало, КС	флутріафол, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00
108	Знахар, КЕ	дифеноконазол, 250 г/л	0,002	виноград виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05) 0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00
109	Зеро, КЕ	хізалофоп- П-етил, 90 г/л	0,01	картопля ²	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,04
110	Імісід, БТ, ТН	імідаклоприд, 500 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,00
111	Імпекс Дуо, РК	імазамокс,	3,0	Контроль по імазамоксу та ім:			

		33 г/л +		соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
112	Імперіал, РК	імазамокс, 33 г/л +	3,0	Контроль по імазамоксу та імазапіру			
				соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
113	Імпреза, РК	Контроль по імазамоксу та імазапіру					
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потраплянні	/0,05

		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.	на шкіру /1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
114	Іназума, ВГ	ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	Контроль по ацетаміприду та лямбда			
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003	ріпак (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003
					0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	/0,2	/0,003
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
115	Іназума, ВГ	ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	Контроль по ацетаміприду та лямбда			
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003	соняшник ¹ (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003
					0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,003
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,4* (межа визн.	/0,1 небезпечний	/0,003

		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	томати	ГРХ-0,2) 0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	при потраплянні на шкіру /0,2	/0,003
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		ацетаміприд, 100 г/кг +	0,01	томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003
		лямбда- цигалотрин, 30 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
116	Інспектор, ВГ	імідаклоприд, 700 г/кг	0,06	капуста ²	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003
117	Каліпсо 480 SC, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	суниця	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,3	/0,003
118	Каліф, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно) соя (олія)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02) не потр.*	/0,5	/0,01
119	Кальма, КЕ	тринексапак- етил, 175 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01

120	Канонір Ультра FS, TH	імідаклоприд, 600 г/л	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
121	Карабас, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,005
122	Каратель Плюс ЕС, КЕ	біфентрин, 100 г/л	0,02	soя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,005
				soя (олія)	не потр.*		
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)		
				ріпак (олія)	не потр.*		
123	Капітал, КС	азоксистробін, 150 г/л +	0,03	Контроль по азоксистробіну, ципроконазол			
		ципроконазол, 60 г/л +	0,002	soя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		епоксиконазол, 50 г/л	0,004		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01
		азоксистробін, 150 г/л +	0,03		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,000
		ципроконазол, 60 г/л +	0,002	soя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01
		азоксистробін, 150 г/л +	0,03		не потр.	/0,1	/0,01
		ципроконазол, 60 г/л +	0,002				
		азоксистробін, 150 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		ципроконазол, 60 г/л +	0,002		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01
		епоксиконазол,	0,004				

		50 г/л			0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,000
		азоксистробін, 150 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01
		ципроконазол, 60 г/л +	0,002		не потр.	/0,1	/0,01
		епоксиконазол, 50 г/л	0,004		не потр.*	/0,01	/0,000
124	Капут, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	1,0/	/0,01
125	Квелекс 270, ВГ	галауоксифен- метил, 100 г/кг +	0,02	Контроль по галауоксифен-метилу та			
		флорасулам, 100 г/кг	0,05	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,006 (межа ви ВЕРХ-0,0
		антидот клоквінтосет у формі кислоти, 70,8 г/кг	не потр.	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003
					не потр.	не потр.	не пот
126	Кіпер, КС	тіабендазол, 250 г/л +	0,1	Контроль по тіабендазолу та теб			
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03	соняшник ¹ (насіння)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,08
		тіабендазол, 250 г/л +	0,1		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,08
					не потр.	/0,4	/0,02

		тіабендазол, 250 г/л +	0,1	соє (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,08
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		0,15** (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,4	/0,02
		тіабендазол, 250 г/л +	0,1	соє (олія)	не потр.	/1,0	/0,08
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		не потр.	/0,4	/0,02
		тіабендазол, 250 г/л +	0,1	ріпак (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,08
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		0,5** (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
		тіабендазол, 250 г/л +	0,1	соє (олія)	не потр.	/1,0	/0,08
		тебуконазол, 162,5 г/л	0,03		не потр.	/0,4	/0,02
127	Клематіс, СК	кломазон, 360 г/л	0,04	соє (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,01
				соє (олія)	не потр.*		
				ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)		
				ріпак (олія)	не потр.*		
128	Клінч Макс, ВГ	римсульфурон, 250 г/кг +	0,02	Контроль по римсульфурону та тіфенсу			
		флорасулам, 80 г/кг	0,05	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01
					0,1*	/1,0	/0,005

		+			(межа визн. ВЕРХ-0,1)		
		тіфенсульфурон- метил, 150 г/кг	0,01		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,1	/0,01
		римсульфурон, 250 г/кг +	0,02	кукурудза (олія)	не потр.	/1,0	/0,01
		флорасулам, 80 г/кг +	0,05		не потр.	/1,0	/0,003
		тіфенсульфурон- метил, 150 г/кг	0,01		не потр.	/0,1	/0,01
129	Клодекс Про, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,01
				соя (олія)	не потр.*		
130	Клом БТ, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,01
				соя (олія)	не потр.*		
131	Клоті-200, КС	клотіанідин, 200 г/л	0,08	картопля ²	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02
132	Командор Гранд, ТН	альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	Контроль по імідаклопри			
				зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003
		альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,1 небезпечний при	/0,003

		імідаклоприд, 500 г/л	0,06			потраплянні на шкіру	
					0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,00%
		альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	соняшник (олія)	не потр.	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00%
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		не потр.	/0,2	/0,00%
		альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00%
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,00%
		альфа- циперметрин, 50 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	не потр.	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00%
		імідаклоприд, 500 г/л	0,06		не потр.	/0,2	/0,00%
133	Кольт 690, ЗП / Тікос 690, ЗП	диметоморф, 90 г/кг +	0,1	Контроль по манкоцебу та			
				томати ²	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,00%
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005	томатний сік	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,01
		диметоморф, 90 г/кг +	0,1	томати	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,00%
		манкоцеб, 600 г/кг	0,005		0,05* (межа визн.	0,5/	/0,01

		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,003	томатний сік	ГРХ-0,05) 0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02) 0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	не потр.	не пот
134	Конвізо ОД, МД	форам- сульфурон, 50 г/л +	0,5	Контроль по форамсульфурону та тієнк			
				буряки цукрові	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,5	/0,03
		тієнкарбазон- метил, 30 г/л	0,05		0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,02
135	Коннект 112,5 SC, KC	імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	Контроль по імідаклопри			
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,005
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.	/0,2	/0,005
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,005
136	Корум, РК	бентазон, 480 г/л +	0,1	Контроль по бентазону			
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
		імазамокс, 22,4 г/л	3,0		0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/1,0	/0,04
		бентазон, 480 г/л	0,1	соя (олія)	не потр.*	/1,0 небезпечний	/0,05

		+				при потраплянні на шкіру	
		імазамокс, 22,4 г/л	3,0		не потр.*	/1,0	/0,04
137	Креатор БТ, ТН	дифеноконазол, 200 г/л +	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00
		ципроконазол, 6,3 г/л	0,002	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01
138	Кронверк, КЕ	пендиметалін, 330 г/л	0,008	соняшник (насіння)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03)	0,5/	/0,00
				соняшник (олія)	не потр.		
139	Круз 350, ТН	клотіанідин, 50 г/л	0,08	буряки цукрові	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02
140	Купроксат, КС	міді сульфат, 345 г/л	0,05 (по міді)	соняшник (насіння)	5,0 (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,5/	0,003 максимал разові
				соняшник (олія)	не потр.		0,001 середні добові
				соя (зерно)	5,0* (межа ви- значення спектро- фотометричним методом (далі - межа визн. СФ)-1,0)		
				соя (олія)	не потр.		

141	Кустодія, КС (МСW 710, КС)	азоксистробін, 120 г/л +	0,03	Контроль по азоксистробіну та те			
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,4	/0,02
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/0,4	/0,02
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,4	/0,02
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,4	/0,02
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,4	/0,02

		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,07* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
		азоксистробін, 120 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,4	/0,02
142	Лірум 78 SC, КС	абамектин, 18 г/л +	0,0002	Контроль по циантраніліпі			
				яблука	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,04	/0,000
		циантранілі- прол, 60 г/л	0,002	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,000	
		абамектин, 18 г/л +	0,0002	яблучний сік	не потр.	/0,04	/0,000
		циантранілі- прол, 60 г/л	0,002	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,000	
143	Луна Експірієнс 400 SC, КС	флуопірам, 200 г/л +	0,01	Контроль по флуопіраму та тебу			
		цибуля (ріпка)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,000		
		тебуконазол, 200 г/л	0,03	0,1** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,4	/0,02	
144	Луна Сенсейшен 500 SC, КС	флуопірам, 250 г/л +	0,01	Контроль по флуопіраму та трифлс			
				яблука ²	0,5*** (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,000

		трифлоркси- стробін, 250 г/л	0,02		0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,8	/0,01
		флуопірам, 250 г/л +	0,01	яблучний сік	не потр.*	/1,0	/0,003
		трифлоркси- стробін, 250 г/л	0,02		не потр.*	/0,8	/0,01
		флуопірам, 250 г/л +	0,01	персики ²	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,003
		трифлоркси- стробін, 250 г/л	0,02		0,04* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,8	/0,01
		флуопірам, 250 г/л +	0,01	персиковий сік	не потр.*	/1,0	/0,003
		трифлоркси- стробін, 250 г/л	0,02		не потр.*	/0,8	/0,01
145	Мадбон, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	/1,0	/0,05
				соє (олія)	не потр.*	небезпечний при потраплянні на шкіру	
146	Мадера 48, РК	імазамокс, 33 г/л +	3,0	Контроль по імазамоксу та іма			
		імазапир, 15 г/л	1,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,05
			1,0		не потр.	/1,0	/0,04

		імазапір, 15 г/л			не потр.	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
147	Мазогрін SC, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно) кукурудза (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1) не потр.*	/0,2	/0,00€
148	Максим 025 FS, TH	флудіоксоніл, 20 г/л	0,015	соняшник (насіння) соняшник (олія)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5) 0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,00%
149	Максим Адванс 195 FS, TH	Контроль по тіабендазолу, флудіоксонілу					
		тіабендазол, 150 г/л +	0,1	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,08
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,00%
		металаксил-М, 20 г/л	0,03		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01
		тіабендазол, 150 г/л +	0,1	соя (зерно)	не потр.*	/1,0	/0,08
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		не потр.*	/1,0	/0,00%
150	Максим Тріо	металаксил-М, 20 г/л	0,03		не потр.*	0,5/	/0,01
		Контроль по флудіоксонілу та дифе					
		флудіоксоніл,	0,015	зерно хлібних	0,02*	/1,0	/0,00%

	60 FS, TH	25 г/л +		злаків	(межа визн. ВЕРХ-0,02)		
		дифеноконазол, 25 г/л +	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00
		тебуконазол, 10 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
151	Максон, КЕ	пропіконазол, 250 г/л +	0,04	Контроль по пропіконазолу та циг.			
		ципроконазол, 80 г/л	0,002	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,00
					0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,01
152	Маркіз, БТ ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,00
153	Масай, ЗП	тебуфенпірад, 200 г/кг	0,002	соя (зерно)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,00
				соя (олія)	не потр.		
154	Матадор Макс, ТН	імідаклоприд, 500 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,00
				картопля ² (крім ранніх сортів)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)		
155	Медісон 263 SC, КС	протіоконазол, 175 г/л +	0,001	Контроль по трифлуксистробіну та прот.			
		трифлуксис- тробін, 88 г/л	0,02	буряки цукрові	0,3** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,00
					0,05** (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,8	/0,01
156	Мелон, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01

157	Мендор, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соє (зерно) соє (олія)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1) не потр.*	/0,3	/0,003
158	Меценат, КЕ	пропіконазол, 250 г/л	0,04	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	0,5/	/0,003
159	Мікро, ВП	ацетаміпрід, 200 г/кг	0,01	яблука яблучний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,025) 0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/0,2	/0,003
160	Міледі Спрей, КР	імідаклопрід, 0,1 г/л	0,06	декоративні культури захищеного грунту ²	не потр.	/0,2	/0,003
161	Мілонга, СЕ	Контроль по тербутилазину та S-м					
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,02
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,02
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003		0,4* (межа визн.	/1,0	/0,05

		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01	соняшник (насіння)	ГРХ-0,2) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003		не потр.*	/1,0	/0,05
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,02
162	Містард, ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,1	/0,003
				соняшник (олія)	не потр.*		
163	Містраль, ВГ	метрибузин, 700 г/кг	0,004	картопля	0,1** (межа визн. ТШХ-0,03)	/0,3	/0,003
164	Мобіль, ВГ	ципродиніл, 700 г/кг	0,03	яблука	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1	/0,05
				яблучний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)		
				виноград	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)		
				виноградний сік	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)		
165	Мовенто 100 SC, KC	спіротетрамат, 100 г/л	0,01	Контроль по сумі спіротетрамату та спіротетрамат-енолу, вираженій як спіротетрамат		/1,0	/0,003
				яблука	0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				яблучний сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)		

				груші	0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				грушевий сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				огірки	0,15** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
166	Мовенто 100 SC, KC	спіротетрамат, 100 г/л	0,01	Контроль по сумі спіротетрамату та спіротетрамат- енолу, вираженій як спіротетрамат		/1,0
				виноград	0,8** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,003
				виноградний сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				огірки закритого ґрунту	0,15** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				томати відкритого ґрунту	1,0** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				томати закритого ґрунту	1,0** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				томатний сік	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				капуста	0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	
				соя (зерно)	0,9** (межа визн. ВЕРХ-0,2)	
				соя (олія)	0,4** (межа визн.	

				цибуля-ріпка (забороняється реалізація цибулі на перо)	ВЕРХ-0,4) 0,3** (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
167	Моспілан Про, РК	ацетаміприд, 120 г/л	0,01	ріпак ¹ (насіння) ріпак (олія)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05) не потр.	/0,2	/0,003
168	Мотор, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно) соя (олія)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1) не потр.*	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
169	Мушкет Плюс 460, МД	йодсульфурон-метил натрію, 5 г/л + 2,4-Д 2-етил-гексиловий ефір, 452, 42 г/л + антидот мефенпір-діетил, 25 г/л	0,03	Контроль по 2,4-Д		Контроль по 2,4-Д 2-етилгексиловому еф	
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,003
			0,0001		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,000
			не потр.			не потр.	не пот
170	Ніко 43, МД	нікосульфурон, 43 г/л	2,0	кукурудза (зерно) кукурудза (олія)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.	/1,0	/0,01

171	Нокаут Екстра, КС	альфа- циперметрин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
				соя (зерно)	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)		
				соя (олія)	не потр.		
172	Нукоп 25 Хай БІО (NUCOP 25 HI BIO), ВГ	хлорокис міді, 423,7 г/кг	0,05 (по міді)	яблука	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; межа визначення методом атомно- адсорбційної спектроскопії (далі - ААС)- 0,5)	0,5/	0,003 максимал разов: 0,001 середні добов:
				яблучний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС- 0,5)		
				виноград	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС- 0,5)		
				виноградний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС- 0,5)		
				огірки	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС- 0,5)		
				томати	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС- 0,5)		
				томатний сік	5,0* (межа визн. ТШХ-1,0; ААС- 0,5)		
				Контроль по прохлоразу та тебу			

173	Орбіт Про, КЕ	прохлораз, 300 г/л +	0,001	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,00
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
174	Орнамент FS, ТН	флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	соє (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,00
				соє (олія)	не потр.		
				кукурудза (зерно)	0,02 (межа визн. ТШХ-0,02)		
				кукурудза (олія)	не потр.		

175	Оскар Преміум, СЕ	тербутилазин, 215 г/л +	0,003	Контроль по тербутилазину та пр			
		пропізохлор, 450 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05
		тербутилазин, 215 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		пропізохлор, 450 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,05
		тербутилазин, 215 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	не потр.*	/1,0	/0,01
		пропізохлор, 450 г/л	0,01		0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05
		тербутилазин, 215 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		пропізохлор, 450 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,05

		пропізохлор, 450 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,01
176	Панда, КЕ	пендиметалін, 330 г/л	0,008	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,5/	/0,002
177	Пантеон WG, ВГ	римсульфурон, 500 г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01
				кукурудза (олія)	не потр.*		
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)		
178	Паритет, КС	прометрин, 500 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0/	/0,02
				соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)		
				соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)		
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)		
				картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)		
				горох	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)		
				Контроль по альфа-циперметрину та			

179	Патріот, КС	імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		альфа- циперметрин, 15 г/л +	0,005		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
		клотіанідин, 50 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02
180	Пектораль SL, РК	імазамокс, 40 г/л	3,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
				соняшник (олія)	не потр.		
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,25)		
				соя (олія)	не потр.		
181	Піктор Актив, КС	піраклостробін, 200 г/л +	0,03	Контроль по піраклостробіну та			
		боскалід, 150 г/л	0,04	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	кукурудза (олія)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01
		боскалід, 150 г/л	0,04		не потр.	/1,0	/0,01
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соя (зерно)	не потр.	/1,5	/0,01
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01
		піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01
		боскалід, 150 г/л	0,04		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01

			піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соя (олія)	ВЕРХ-0,1) не потр.	/1,0	/0,01
			боскалід, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01
			піраклостробін, 200 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
			боскалід, 150 г/л	0,04		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01
			піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
			боскалід, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01
			піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01
			боскалід, 150 г/л	0,04		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,01
			піраклостробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
			боскалід, 150 г/л	0,04		0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,01
			піраклостробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
			боскалід, 150 г/л	0,04		не потр.	/1,5	/0,01

182	Пірикапс, 200 КС	пірипроксифен, 200 г/л	0,07	яблука яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05) не потр.	/2,0	/0,01
183	Пледж 50, ЗП	флуміоксазин, 511 г/кг	0,002	соя (зерно) соя (олія)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05) не потр.	/1,0	/0,00
184	Пленум 50 WG, ВГ	піметрозин, 50 г/л	0,003	ріпак (насіння) ріпак (олія)	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02) не потр.	/1,0 (межа визн. ВЕРХ-0,25)	/0,00; (межа ви ВЕРХ-0,0
185	Поксі, КЕ	епоксиконазол, 75 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,000
186	Поляріс, КЕ	ацетохлор, 900 г/л	0,001	соняшник (насіння) соняшник (олія)	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01) не потр.	1,0/	/0,000
187	Покрова Екстра, КС	прометрин, 500 г/л	0,005	соняшник (насіння) соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0/	/0,02
188	Пончо 600 FS, ТН	клотіанідин, 600 г/л	0,08	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02

				соняшник (олія)	не потр.		
189	Пончо Вотіво 610 FS, TH	клотіанідин, 600 г/л +	0,08	Контроль по клотіанідині			
		Bacillus firmus, 102 г/л	не потр.	кукурудза (зерно)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,5	/0,02
		клотіанідин, 600 г/л +	0,08	кукурудза (олія)	не потр.	/1,5	/0,02
		Bacillus firmus, 102 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не пот
190	Прайм, СЕ	2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452, 42 г/л +	0,0001	Контроль по 2,4-Д		Контроль по 2,4-Д 2-етилгексиловому еф	
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05	кукурудза (зерно)	0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,000
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 452, 42 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,000
		флорасулам, 6,25 г/л	0,05		не потр.	/0,5	/0,000
191	Прем'єр Профі, 79 %, РН	фосфориста кислота, 400 г/л +	2,0	Контроль по імідаклоприду та фл			
		алюмінію фосфіт, 250 г/л +		зерно хлібних злаків	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02
		імідаклоприд,	0,06		0,3* (межа визн. ФМ-0,3)		

		300 г/л +			0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,00±
		флутріафол, 250 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00±
		фосфориста кислота, 400 г/л +	2,0	соя (зерно)	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02
		алюмінію фосфід, 250 г/л +			не потр.		
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,00±
		флутріафол, 250 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00±
		фосфориста кислота, 400 г/л +	2,0	соя (олія)	не потр.*	/0,2	/0,02
		алюмінію фосфід, 250 г/л +			не потр.		
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,00±
		флутріафол, 250 г/л	0,01		не потр.*	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00±
192	Престо, КС	клотіанідин, 200 г/л	0,08	Контроль по клотіанідину та лямбда			
				зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн.	/1,5	/0,02

		+			ВЕРХ-0,02)		
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00
		клотіанідин, 200 г/л +	0,08	картопля	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,025)	/1,5	/0,02
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00
193	Пріма Форте 195, СЕ	флорасулам, 5 г/л +	0,05	Контроль по 2,4-Д		Контроль по 2,4-Д 2-етилгексиловому еф	
		амінопіралід, 10 г/л +	0,05	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,00
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 180 г/л	0,0001		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,05
					0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,5	/0,000
		флорасулам, 5 г/л +	0,05	кукурудза (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,00
		амінопіралід, 10 г/л +	0,05		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,5	/0,05
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 180 г/л	0,0001		0,015* (межа визн. ГРХ-0,015)	/0,5	/0,000
		флорасулам, 5 г/л +	0,05	кукурудза (олія)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,00
		амінопіралід,	0,05		не потр.	/1,5	/0,05

		10 г/л +			не потр.	/0,5	/0,000
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 180 г/л	0,0001				
194	Проксаніл 720, КЕ	пропізохлор, 720 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01
				кукурудза (олія)	не потр.*		
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)		
				соняшник (олія)	не потр.*		
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)		
				ріпак (олія)	не потр.*		
195	Проман 600 SC, КС	метобромурон, 600 г/л	0,025	соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,002
				соя (олія)	не потр.*		
				картопля	0,1* (межа визн. ГРХ-0,02)		
				соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)		
				соняшник (олія)	не потр.*		
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,1)		
					не потр.*		

				соє (олія)			
196	Промостар, КС	імідаклоприд, 150 г/л +	0,06	Контроль по імідаклоприду та лямбд			
				зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,00±
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1	/0,00±
						небезпечний при потраплянні на шкіру	
		імідаклоприд, 150 г/л +	0,06	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,00±
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1	/0,00±
						небезпечний при потраплянні на шкіру	
		імідаклоприд, 150 г/л +	0,06	соє (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,2	/0,00±
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,02* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,1	/0,00±
						небезпечний при потраплянні на шкіру	
197	Пропоніт Дуо, КЕ	Контроль по пропізохлор					
		пропізохлор, 720 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		кломазон, 30 г/л	0,04		0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	/0,5	/0,01
		пропізохлор, 720 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01
		кломазон, 30 г/л	0,04		не потр.*	/0,5	/0,01

198	Пропульс 250 SE, CE	флуопірам, 125 г/л +	0,01	Контроль по флуопіраму та протіокс			
				ріпак ¹ (насіння)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,003
		протіокназол- дестіо, 125 г/л	0,001		0,1*** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,003
		флуопірам, 125 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.*	/1,0	/0,003
		протіокназол- дестіо, 125 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,003
		флуопірам, 125 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2** (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,003
		протіокназол- дестіо, 125 г/л	0,001		0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,003
		флуопірам, 125 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,003
		протіокназол- дестіо, 125 г/л	0,001		не потр.*	/0,2	/0,003
		флуопірам, 125 г/л +	0,01	картопля	0,03*** (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0	/0,003
		протіокназол- дестіо, 125 г/л	0,001		0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,2	/0,003
199	Проспер 300 CS, СК	спіроксамін, 300 г/л	0,01	виноград	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,2	/0,03
				виноградний сік	0,005* (межа визн. ВЕРХ-0,005)	небезпечний при потраплянні на шкіру	

200	Ранголі 315, ЕВ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
201	Ранголі 715, ТН	флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,002
				кукурудза (олія)	не потр.*		
202	Ранголі 815, ТН	тіаметоксам, 350 г/л	0,02	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 аерозоль	/0,03
				соняшник (олія)	не потр.*		
203	Ранголі 1015, ВГ	метрибузин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,3	/0,002
				соя (олія)	не потр.*		
204	Рapidус WG, ВГ	йодсульфурон- метил натрію, 50 г/кг + антидот мефенпір- діетил, 150 г/кг	0,03 не потр.	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05) не потр.	/1,0 не потр.	/0,002 не потр.
		йодсульфурон- метил натрію, 50 г/кг + антидот мефенпір- діетил, 150 г/кг	0,03 не потр.	кукурудза (зерно)	0,025* (межа визн. ВЕРХ-0,025) не потр.	/1,0 не потр.	/0,002 не потр.
		йодсульфурон- метил натрію, 50 г/кг + антидот мефенпір-	0,03 не потр.	кукурудза (олія)	не потр.* не потр.	/1,0 не потр.	/0,002 не потр.

		діетил, 150 г/кг					
205	Раундап Проактив (МОН 79376), РК	гліфосату калієва сіль, 441 г/л	0,01	осіння та весняна обробка землі несільсь- когос- подарсь- кого призна- чення, землі під пар, міжрядь в садах та виноградни- ках зерно хлібних злаків кукурудза (зерно) кукурудза (олія) ріпак (насіння) ріпак (олія) соняшник (насіння) ріпак (олія)	не потр. 3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5) 0,3* (межа визн. ВЕРХ-0,1) не потр. 2,0 (межа визн. ВЕРХ-0,4) не потр. 0,3 (межа визн. ВЕРХ-0,1) не потр.	1,0/	/0,01
206	Рафаль 480, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	соя (зерно) соя (олія)	0,02* (межа визн. ГРХ-0,02) не потр.*	/0,5	/0,01

207	Реглон Форте 200 SL, РК	дикват дибромід, 200 г/л	0,002	виноград	0,05* (межа визн. СФ-0,05)	0,05/	/0,003
				виноградний сік	не потр.*		
				виноград	0,05* (межа визн. СФ-0,05)		
				виноградний сік	не потр.*		

208	Редіго М 120 FS, ТН	протіоконазол, 100 г/л +	0,001	<i>Контроль по протіоконазолу-дестіс</i>			
		металаксил, 20 г/л	0,03	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,003
		протіоконазол, 100 г/л +	0,001	соя (олія)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	0,5/	/0,01
		металаксил, 20 г/л	0,03		не потр.	/0,2	/0,003
209	Рейтар, КС	прометрин, 500 г/л	0,005	картопля ²	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	5,0/	/0,02

210	Рекорд Квадро, ТН	епоксиконазол, 75 г/л +	0,004	<i>Контроль по епоксиконазолу</i>		<i>Контроль по епоксиконазолу</i>	
		карбоксин, 170 г/л +	0,01	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,000
		імідаклоприд, 70 г/л +	0,06		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	1,0/	/0,015
			0,01		0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,003

		ацетаміприд, 100 г/л			0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
211	Римон Фаст, КС	новалурон, 50 г/л +	0,01	Контроль по новалурону та біф			
		біфентрин, 50 г/л	0,02	кукурудза ¹ (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,01
		новалурон, 50 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,01	/0,005
		біфентрин, 50 г/л	0,02		не потр.*	/1,0	/0,01
		новалурон, 50 г/л +	0,01		не потр.*	/0,01	/0,005
		біфентрин, 50 г/л	0,02	яблука	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01
		новалурон, 50 г/л +	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,01	/0,005
		біфентрин, 50 г/л	0,02	яблучний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01
		новалурон, 50 г/л +	0,01		не потр.*	/0,01	/0,005
		біфентрин, 50 г/л	0,02	соя (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,01
		новалурон, 50 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,01	/0,005
		біфентрин, 50 г/л	0,02	соя (олія)	не потр.*	/1,0	/0,01
		новалурон, 50 г/л +	0,01		не потр.*	/0,01	/0,005
		біфентрин, 50 г/л	0,02				

212	Родстер (RODSTER), ВГ	трибенурон- метил, 750 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,003
213	Ротам- тебуконазол 430 CS, КС	тебуконазол, 430 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
214	Руніко, ВГ	нікосульфурон, 750 г/кг	2,0	кукурудза (зерно) кукурудза (олія)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.*	/1,0	/0,01
215	Рутарга, КЕ	хізалофоп- П-етил, 150 г/л	0,01	соя (зерно) соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05) не потр.	/0,2	/0,04
216	Руфас, КЕ	альфа- циперметрин, 200 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003
217	Сальса 75, ВГ	етаметсульфурон- метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння) соняшник (олія) ріпак (насіння) ріпак (олія)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.* 0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01) не потр.*	/1,7	/0,006
218	Самурай, ТН	дифеноконазол, 25 г/л +	0,002	Контроль по тіаметоксам			
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	картопля	0,1** (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,003
		тіаметоксам, 262,5 г/л	0,02		0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02) 0,08* (межа визн. ГРХ-0,04)	/1,0 /0,5 аерозоль	/0,003 /0,03

219	Селебриті, КЕ	хізалофоп- П-етил, 1250 г/л	0,01	соє (зерно)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,04
				соє (олія)	не потр.		
				соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				соняшник (олія)	не потр.		
				ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				ріпак (олія)	не потр.		
220	Селеніт Макс, КЕ	клетодим, 240 г/л	0,01	картопля ²	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,07	/0,005
				буряки цукрові	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)		
				соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,02)		
				соняшник (олія)	не потр.		
221	Селест Топ 312,5 FS, ТН	тіаметоксам, 262,5 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л + дифеноконазол, 25 г/л	0,02 0,015 0,002	Контроль по тіаметоксамі			
		тіаметоксам, 262,5 г/л	0,02	соє (зерно)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/0,5 аерозоль	/0,03
					0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,005
					0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		тіаметоксам, 262,5 г/л	0,02	соє (олія)	не потр.	/0,5 аерозоль	/0,03

		+			не потр.	/1,0	/0,00%
		флудіоксоніл, 25 г/л	0,015				
		+					
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		не потр.	/0,2	/0,00%
222	Серкадіс Плюс, КС	флуксапіроксад, 75 г/л	0,02	Контроль по флуксапіроксаду та дис			
		+		яблука	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,01
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00%
		флуксапіроксад, 75 г/л	0,02	яблучний сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,01
		+					
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00%
		флуксапіроксад, 75 г/л	0,02	груші	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,01
		+					
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00%
		флуксапіроксад, 75 г/л	0,02	грушевий сік	0,05 (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,7	/0,01
		+					
		дифеноконазол, 50 г/л	0,002		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00%
223	Сіметра 325 SC, КС	азоксистробін, 200 г/л	0,03	Контроль по азоксистробіну та із			
		+		ріпак (насіння)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		ізопіразам, 125 г/л	0,01		0,4**	/0,5	/0,00%

		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	(межа визн. ВЕРХ-0,1) не потр.*	/1,0	/0,01
		ізопіразам, 125 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,5	/0,005
224	Систива, ТН (BAS 700 05 F)	флуксапіроксад, 333 г/л	0,02	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/0,7	/0,01
225	Скорпіон Форте, РК	дикват дибромід, 280 г/л	0,002	соя ¹ (зерно)	0,5* (межа визн. ФМ-0,2)	0,05/	/0,005
				соя (олія)	0,1* (межа визн. ФМ-0,05)		
				ріпак ¹ (насіння)	0,4* (межа визн. ФМ-0,4)		
				ріпак (олія)	не потр.		
226	Снаряд, РК	імідаклоприд, 200 г/л	0,06	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)		
227	Сойгард WG, ВГ	хлоримурон-етил, 750 г/кг	0,001	соя (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/2,0	/0,005
				соя (олія)	не потр.*		
228	Сойгард Голд SL, РК	ацифлуорфен, 214 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1)	/0,2 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,01
				соя (олія)	не потр.*		

229	Соле БГ, ВГ	цимоксаніл, 250 г/кг +	0,05	Контроль по фамоксадоі			
		фамоксадон, 250 г/кг	0,01	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,03
		цимоксаніл, 250 г/кг +	0,05	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,03
		фамоксадон, 250 г/кг	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
230	Соле БГ, ВГ	цимоксаніл, 250 г/кг +	0,05	Контроль по цимоксанілу та мет			
		металаксил, 80 г/кг	0,03	соняшник (насіння)	0,04* (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,03
		цимоксаніл, 250 г/кг +	0,05	соняшник (олія)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,03
		металаксил, 80 г/кг	0,03		0,5* (межа визн. ГРХ-0,5)	0,5/	/0,01
231	Сокар, РК (БЗПФ-1, РК)	гліфосату амонійна сіль, 480 г/л	0,01	обробка землі під пар, під посіви зернових колосових культур, землі несільсь- когоспо- дарського призначення	не потр.	1,0/	/0,01

232	Солцин 40, КС	нікосульфурон, 40 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01
				кукурудза (олія)	не потр.*		
233	Сонідо 400 FS, ТН	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,3	/0,002
				кукурудза (олія)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)		
234	Сора-Нет, КЕ (ВК-1401)	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,01
				соняшник (олія)	не потр.		
				соя (зерно)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)		
				соя (олія)	не потр.		
235	Сотейра, РК	імазамокс, 33 г/л +	3,0	Контроль по імазамоксу			
		імазапір, 15 г/л	1,0	соняшник (насіння)	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0	/0,04
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.*	/1,0 небезпечний	/0,05

						при потраплянні на шкіру	
236	Спіротет- рамат		0,01				
237	Статус, КС	імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	Контроль по імідаклоприду та лямбд			
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05) 0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,2 /0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005 /0,005
238	Стеллар, РК (BAS 77601 Н)	топрамезон, 50 г/л +	0,0005	Контроль по топрамезону та д			
		дикамба, 160 г/л	0,004	кукурудза (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2) 0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,5 1,0/	/0,005 /0,01
		топрамезон, 50 г/л +	0,0005	кукурудза (олія)	не потр.*	/0,5	/0,005
		дикамба, 160 г/л	0,004		не потр.*	1,0/	/0,01
239	Стрім Турбо SE, KE	тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	Контроль по тербутилазину та S-м			
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2) 0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0 /1,0	/0,05 /0,02
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,02

		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,02
240	Сферіко, ТН (MIL FF 053912, ТН)	флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	Контроль по флудіоксонілу та кіралаксил.			
		кіралаксил, 20 г/л	0,001	соє (зерно)	0,4* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,005
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015	соє (олія)	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,005
		кіралаксил, 20 г/л	0,001		не потр.*	/1,0	/0,005
					не потр.*	/0,5	/0,005
241	Суховій Некст, РК	дикват дибромід, 280 г/л	0,002	соняшник ¹ (насіння)	0,5* (межа визн. СФ-0,05)	0,05/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005
				соняшник (олія)	не потр.*		
				соє ¹ (зерно)	0,5* (межа визн. СФ-0,25)		
				соє (олія)	не потр.*		
				ріпак ¹ (насіння)	0,4* (межа визн. СФ-0,4)		

				ріпак (олія)	не потр.*		
242	Т-2, КС	імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	Контроль по імідаклоприду та лямбд			
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005
				томати	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06		0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005
				томатний сік	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		лямбда- цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005
243	Т-12, РК	гліфосату калійна сіль, 551 г/л, в кислотному еквіваленті - 450 г/л	0,01	землі сільськогос- подарського призначення 2	не потр.	1,0/	/0,01
244	Табу Нео, КС	імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	Контроль по імідаклоприду та кл			
				зерно хлібних злаків	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		клотіанідин, 100 г/л	0,08		0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,5	/0,02

245	Табу Супер, КС	імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	Контроль по імідаклоприду та ф			
				картопля	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		0,001* (межа визн. ГРХ-0,001)	/0,01	/0,000
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		0,002* (межа визн. ГРХ-0,001)	/0,01	/0,000
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не потр.	/0,2	/0,005
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		не потр.	/0,01	/0,000
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,005
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		0,002* (межа визн. ГРХ-0,001)	/0,01	/0,000
		імідаклоприд, 400 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.	/0,2	/0,005
		фіпроніл, 100 г/л	0,00025		не потр.	/0,01	/0,000
		246	Тазумі WG, ВГ	етаметсульфурон- метил, 750 г/кг	0,02	соняшник (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)
				соняшник (олія)	не потр.*		
				ріпак (насіння)	0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)		
					не потр.*		

				ріпак (олія)			
247	Талендо 20, КЕ	проквіназид, 200 г/л	0,001	яблука	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,00
				яблучний сік	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)		
248	Танос 50, ВГ	цимоксаніл, 250 г/кг +	0,05	Контроль по фамоксадон			
		фамоксадон, 250 г/кг	0,01	соя (зерно)	0,02 (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,03
		цимоксаніл, 250 г/кг +	0,05		0,04 (межа визн. ВЕРХ-0,04)	/1,0	/0,01
		фамоксадон, 250 г/кг	0,01	соя (олія)	не потр.	/1,0	/0,03
					не потр.	/1,0	/0,01
249	Тарга Супер, КЕ	хізалофоп- П-етил, 50 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,04
				соняшник (олія)	не потр.*		
250	Тарзек 660, ВГ	галауоксифен- метил, 66,67 г/кг +	0,02	Контроль по галауоксифен-метилу та			
		пірокссулам, 250 г/кг +	0,05	зерно хлібних злаків	0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/1,0	/0,00
		антидот клоквінтосет у	не потр.		0,01* (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,00
					не потр.	не потр.	не пот

		формі кислоти, 354 г/кг					
251	Таффін 320, КС	азоксистробін, 200 г/л +	0,03	Контроль по азоксистробіну, ципі			
		ципроконазол, 120 г/л	0,002	соє (зерно)	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соє (олія)	0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1	/0,01
		ципроконазол, 120 г/л	0,002		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/1,0	/0,01
252	Тезис, КС	тебуконазол, 500 г/л	0,03	зерно хлібних злаків	не потр.	/0,1	/0,01
253	Тельдор, 50 WG, ВГ	фенгексамід, 500 г/кг	0,18	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
				виноград	4,0** (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/2,0	/0,005
				виноградний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				персик	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				персиковий сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				черешня	0,2** (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				черешневий	0,1*		

				сік	(межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				суниця	0,1 (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				суничний сік	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
254	Терція, КС	прохлораз, 60 г/л + тритіконазол, 20 г/л + азоксистробін, 10 г/л	0,001 0,025 0,03	<i>Контроль по прохлоразу</i>		<i>Контроль по прохл.</i>	
				зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,00
					0,025* (межа визн. ГРХ-0,025)	/0,2	/0,00
					0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
255	Тітон, МД	нікосульфурон, 80 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,01
				кукурудза (олія)	не потр.*		
256	Толазин, КС	тербутилазин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003 0,01	<i>Контроль по тербутилазину та S-м.</i>			
				кукурудза (зерно)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05
					0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,02
				кукурудза (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05
					не потр.*	/1,0	/0,02
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05

		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02
		тербутилазин, 187,5 г/л +	0,003	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05
		S-метолахлор, 312,5 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,02
257	Топазіо, ВГ	сірка, 800 г/кг	не норму- ється	зерно хлібних злаків	не потр.	6,0/	/0,07
				буряки цукрові	не потр.		
				ріпак	50,0 (межа визн. ВЕРХ-10,0)		
				ріпак (олія)	не потр.		
				яблука	50,0 (межа визн. ВЕРХ-5,0)		
				яблучний сік	не потр.		
258	Топшот, 113 OD, МД	пенокссулам, 13,33 г/л +	0,005	Контроль по цигалофоп-бу			
		цигалофоп-бутил, 100 г/л	0,003	рис ¹	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,00
					0,02** (межа визн. ВЕРХ-0,02) (по сумі кислоти та ефіру)	/1,5	/0,00
259	ТОР БТ, КЕ	альфа- циперметрин, 100 г/л	0,005	зерно хлібних злаків	0,01* (межа визн. ГРХ-0,01)	/0,1	/0,00
				ріпак (насіння)	0,4* (межа визн.	небезпечний при потраплянні на шкіру	

				ріпак (олія)	ГРХ-0,2) 1,0* (межа визн. ГРХ-0,4)		
260	Траумікс БТ, КС	тіофанат- метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,08 0,004 0,03 0,01	Контроль по карбендазиму, епоксиконазолу, тебуконазолу		Контроль по тіофана метилу, епоксиконазолу	
				зерно хлібних злаків	1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,1/	/0,01
					0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,000
					0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
					0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,00
261	Трибунал, РГ	трибенурон- метил, 500 г/кг	0,005	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,005)	/0,1	/0,00
				соняшник (насіння)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)		
				соняшник (олія)	не потр.*		
262	Триназон FS, КС	третіконазол, 20 г/л + прохлораз, 60 г/л	0,025 0,001	Контроль по прохлораз			
				зерно хлібних злаків	0,025* (межа визн. ГРХ-0,025)	/0,2	/0,00
					0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,1	/0,00
263	Трон, ВГ (Ранголі 915)	римсульфурон, 250 г/кг	0,02	кукурудза (зерно)	0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0	/0,01

				кукурудза (олія)	не потр.*		
264	Урожай, ВГ	тебуконазол, 750 г/кг	0,03	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
265	Фагро ВДДж, РГ	гліфосату амонійна сіль, 75,7 %, в кислотному еквіваленті - 68 %	0,01	зерно хлібних злаків обробка землі під пар, землі несільськогос- подарського призначення	3,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5) не потр.*	1,0/	/0,01
266	Фантік М, ЗП	беналаксил-М, 4 % + манкоцеб, 65 %	0,001 0,005	Контроль по манкоцебу та			
						/0,5	/0,005
						0,5/	/0,01
267	Фантом, КС	флутріяфол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,005
268	Федерал, РК	гліфосату ізопропіл- амінна сіль, 480 г/л + дикамба, 60 г/л	0,01 0,004	обробка землі під пар, землі несільсь- когос- подарського призначення 2	не потр.* не потр.*	1,0/ 1,0/	/0,01 /0,01
269	Фіст, СК	пендиметалін, 38,70 %	0,008	сояшник (насіння) сояшник (олія)	0,03* (межа визн. ГРХ-0,03) не потр.	0,5/	/0,005

270	Фитал [®] , РК	фосфориста кислота, 80 г/л +	2,0	Контроль по сумі фосфористої кислоти та			
		алюмінію фосфіт, 570 г/л		кукурудза (зерно)	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02
		фосфориста кислота, 80 г/л +	2,0	кукурудза (олія)	не потр.	/0,2	/0,02
		алюмінію фосфіт, 570 г/л			не потр.		
		фосфориста кислота, 80 г/л +	2,0	соняшник (насіння)	0,3* (межа визн. ФМ-0,3)	/0,2	/0,02
		алюмінію фосфіт, 570 г/л			0,3* (межа визн. ФМ-0,3)		
271	Флейм Плюс, SC, KC	флорасулам, 50 г/л	0,05	зерно хлібних злаків	0,01** (межа визн. ВЕРХ-0,01)	/1,0	/0,003
				кукурудза (зерно)	0,1** (межа визн. ВЕРХ-0,1)		
				кукурудза (олія)	не потр.		
272	Флінт Стар 520, KC та Скала 400, KC	піриметаніл	0,02			/1,0	/0,02
273	Флористин, КР	піридабен,	0,03	Контроль по пенконазолу та пі			

		0,15 г/л +		декоративні культури відкритого грунту, у тому числі квіти ²	не потр.	/0,2	/0,00 ⁺
		пенконазол, 0,2 г/л +	0,007		не потр.	/0,8	/0,02
		тіаметоксам, 0,1 г/л	0,02		не потр.	/0,5 аерозоль	/0,03
		піридабен, 0,15 г/л +	0,03	декоративні кімнатні культури ²	не потр.	/0,2	/0,00 ⁺
		пенконазол, 0,2 г/л +	0,007		не потр.	/0,8	/0,02
		тіаметоксам, 0,1 г/л	0,02		не потр.	/0,5 аерозоль	/0,03
274	Фронт'єр Оптима, КЕ	диметенамід-П, 720 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)	/0,7	/0,01
				кукурудза (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02)		
275	Фулгор Голд 500, КС	карбендазим, 300 г/л +	0,01	Контроль по карбендазиму та фл			
				зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,00 ⁺
		флутріяфол, 200 г/л	0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00 ⁺
		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/	/0,00 ⁺
		флутріяфол, 200 г/л	0,01		0,2* (межа визн. ГРХ-0,2)	/0,1 небезпечний при потраплянні	/0,00 ⁺

		карбендазим, 300 г/л +	0,01	соє (олія)	не потр.*	на шкіру 0,1/	/0,00*
		флутріяфол, 200 г/л	0,01		не потр.*	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00*
276	Фунабен Т 480, ТН	карбендазим, 148 г/л +	0,01	Контроль по тираму та карбен			
		тирам, 332 г/л	0,005	соє (зерно)	0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/	/0,00*
		карбендазим, 148 г/л +	0,01		0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,5/	0,05 - максимал разові
		тирам, 332 г/л	0,005	соє (олія)	не потр.	0,1/	0,02 - середні добові
		тирам, 332 г/л	0,005		не потр.	0,5/	0,05 - максимал разові
							0,02 - середні добові
277	Фундазим 500, КС	карбендазим, 500 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,00*
278	Футурин, ВГ	дикамбі натрієва сіль, 660 г/кг +	0,004	Контроль по дикамбі			
		тіфенсульфурон- метил, 60 г/кг	0,01	газонні трави ²	добине потр. не потр.	1,0/	/0,01
						/0,1	/0,01
279	Хантер, РК	імазамокс, 33 г/л	3,0	Контроль по імазамоксу та ім			
				соняшник (насіння)	1,0* (межа визн.	/1,0	/0,04

		+			ВЕРХ-0,5)		
		імазапір, 15 г/л	1,0		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,5)	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
		імазамокс, 33 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,04
		імазапір, 15 г/л	1,0		не потр.*	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
280	Хелпіт, РК	дикамба, 480 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	1,0/	/0,01
281	Цербер, КЕ	хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	Контроль по хлорпірифос			
		циперметрин, 50 г/л	0,003	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,01)	0,3/ небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00
					0,1* (межа визн. ГРХ-0,04)	/0,2	0,04 - максимал разов: 0,01 - середні добов:
282	Циделі Топ 140 ДС, ДК	дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	Контроль по дифеноконазолу та ци			
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01	яблука	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00
					0,05**	/1,0	/0,00€

		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	яблучний сік	(межа визн. ГРХ-0,05) 0,05* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/0,2	/0,00
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		не потр.*	/1,0	/0,00€
283	Циделі Топ 140 ДС, ДК	дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	Контроль по дифеноконазолу та ци			
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01	огірки відкритого ґрунту	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	огірки закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		0,04** (межа визн. ГРХ-0,04)	/1,0	/0,00€
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	томати закритого ґрунту	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/0,2	/0,00
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		0,02** (межа визн. ГРХ-0,02)	/1,0	/0,00€
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	томатний сік	не потр.	/0,2	/0,00
		цифлуфенамід, 15 г/л	0,01		не потр.	/1,0	/0,00€
284	Челендж 600 SC, KC	аклоніфен, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,05)	/1,0 (межа визн. ВЕРХ-0,2)	/0,00€ (межа ви ВЕРХ-0,с
				соняшник (олія)	не потр.*		
				морква	0,1**		

				цибуля-ріпка (забороняється реалізація цибулі на перо)	(межа визн. ВЕРХ-0,02) 0,05** (межа визн. ВЕРХ-0,01)		
285	Чемп Ультра DP, ВГ	міді гідроксид, 576 г/кг	0,05 (по міді)	зерно хлібних злаків	5,0* (межа визн. СФ-1,0) (по міді)	0,5/	0,03 - максимал разов: 0,005 середні добов:
286	Широ, ВГ	трифлу-сульфурон-метил, 500 г/кг	0,05	буряки цукрові	0,05** (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0	/0,1
287	Штармоні, ВГ	тіфенсульфурон-метил, 750 г/кг	0,01	соя (зерно) соя (олія)	0,02* (межа визн. ВЕРХ-0,02) не потр.*	/0,1	/0,01
288	Штефазон, РК	бентазон, 480 г/л	0,1	соя (зерно) соя (олія)	0,1* (межа визн. ТШХ-0,1) не потр.*	/1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,05
289	Штефамба, РК	дикамба у формі диметиламінної солі, 480 г/л	0,004	зерно хлібних злаків	0,04* (межа визн. ГРХ-0,04)	1,0/	/0,01
290	Штефаране, KE	флуроксипір, 333 г/л	0,2	зерно хлібних злаків	0,05 (межа визн. ГРХ-0,025)	/1,0	/0,005

291	Штефекстра, СЕ	тербутилазин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003	Контроль по тербутилазину та S-м			
				соняшник (насіння)	0,4* (межа визн. ГРХ-0,2)	/1,0	/0,05
			0,01		0,1* (межа визн. ГРХ-0,1)	/1,0	/0,02
		тербутилазин, 187,5 г/л + S-метолахлор, 312,5 г/л	0,003	соняшник (олія)	не потр.*	/1,0	/0,05
			0,01		не потр.*	/1,0	/0,02
292	Штефком, КЕ	кломазон, 480 г/л	0,04	ріпак (насіння)	0,5* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,5	/0,01
				ріпак (олія)	не потр.*		
293	Штефпакт, КС	флутріафол, 250 г/л	0,01	зерно хлібних злаків	0,1* (межа визн. ГРХ-0,008)	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,00
294	Штеф-протруйник, ТН	дифеноконазол, 40 г/л + тебуконазол, 40 г/л + азоксистробін, 15 г/л	0,002	Контроль по дифеноконазолу			
				зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/0,2	/0,00
			0,03		0,2* (межа визн. ГРХ-0,07)	/0,4	/0,02
			0,03		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	/1,0	/0,01
				Контроль по епоксиконазолу та карбендазиму		Контроль по епоксиконазолу та тіофанат-метилу	

295	Штиль, КС	епоксиконазол, 187 г/л +	0,004	зерно хлібних злаків	0,05* (межа визн. ГРХ-0,02)	/0,01	/0,000
		тіофанат- метил, 310 г/л +	0,08		1,0* (межа визн. ВЕРХ-0,05)	0,1/	/0,01
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,2* (межа визн. ВЕРХ-0,1)	0,1/	/0,00
296	Штума, ЕВ	феноксапроп- п-етил, 69 г/л + антидот клоквінтосет- мексил, 34,5 г/л	0,01 не потр.	зерно хлібних злаків	0,2* (межа визн. ТШХ-0,2) (межа визн. ВЕРХ-0,2) не потр.	/0,6 не потр.	/0,00; не пот
297	Юнімарк, ВГ	метрибузин, 700 г/кг	0,004	соя (зерно) соя (олія)	0,1* (межа визн. ГРХ-0,1) не потр.	/0,3	/0,00;
298	Юніформ 446 SE, KE	азоксистробін, 322 г/л +	0,03	Контроль по азоксистробіну та мет			
		металаксил-М, 124 г/л	0,03	цибуля (ріпка)	0,1* (межа визн. ВЕРХ-0,05) 0,05* (межа визн. ГРХ-0,05)	/1,0 0,5/	/0,01 /0,01
299	Ямато, СЕ	тіофанат- метил, 233 г/л +	0,08	Контроль по карбендазиму (сума тіофанат-метилу і карбендазиму) та тетраконазолу		Контроль по тіофанат-ме та тетраконазолу	
				соя (зерно)	0,5* (межа визн. ВЕРХ-0,2) 0,02** (межа визн.	0,1/ /0,3	/0,01 /0,00

		тетраконазол, 70 г/л +	0,002		ВЕРХ-0,02)		
					0,15* (межа визн. ВЕРХ-0,15)	0,1/	/0,00 ¹
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01	соя (олія)	не потр.*	0,1/	/0,01
		тіофанат- метил, 233 г/л +	0,08		не потр.*	/0,3	/0,00 ¹
		тетраконазол, 70 г/л +	0,002		не потр.*	0,1/	/0,00 ¹
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01				

¹ Препарат рекомендовано для застосування авіаційним методом.

² Препарат рекомендовано для роздрібного продажу населенню.

* Державні санітарні правила та норми "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті" (ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 20 вересня 2001 року N 137.

** EU Pesticides database.

*** Codex Maximum Residue Limits (MRLs), Codex Alimentarius Commission.

В. о. начальника управління
громадського здоров'я

Н. Півень